

Рекомендуемые показания при направлении пациентов на стереотаксическую лучевую терапию на системе КиберНож

| Нозологическая форма | Показания |
|----------------------------------|---|
| ЗНО головного мозга | <p>1. Метастазы в головной мозг от 2 до 30 мм не более 5-ти (для меланомы, рака почки до 10). Первичный очаг должен быть подтвержден гистологически, должен быть контроль над первичным очагом, либо иметься план последующего его лечения</p> <p>2. Глиомы до 40мм (диагноз должен быть гистологически подтвержден, рецидив или остаточная опухоль после комплексного лечения, четкие границы по МРТ)</p> <p>3. Менингиомы до 35мм (удаленность от органов риска на 3-5 мм, остаточная опухоль после хирургического лечения; хирургическая недоступность; противопоказания к хирургии; отказ пациента от хирургии)</p> <p>4. Аденомы гипофиза все, кроме пролактиномы (после субтотальной резекции; повышенная гормональная активность после операции; удаленность от зрительных трактов на 3-5 мм)</p> <p>5. Невриномы до 35 мм (при отсутствии компрессии, деформации ствола и IV желудочка)</p> <p>6. Краинифарингиома (рецидив или остаточная опухоль после хирургического лечения)</p> <p>7. Хордомы (рецидив или остаточная опухоль после хирургического лечения)</p> <p>8. Опухоли pineальной области (после гистологической верификации опухоли, при толерантности к лучевой и химиотерапии)</p> <p>9. Невралгия тройничного нерва (нейроваскулярный конфликт; выраженный длительный болевой синдром, резистентный к другим методам лечения; исключить Herpes zoster, поражение зубов, поражение органов орбиты, артрит височно-нижнечелюстного сустава)</p> |
| ЗНО легких | <p>1.Периферический немелкоклеточный рак легкого T1N0M0 от 5 до 50 мм без пораженных лимфоузлов средостения, без удаленных метастазов</p> <p>2.Метастазы в легких не более 5-ти на оба легких от 5 до 30мм</p> |
| ЗНО печени | <p>1.Первичный рак печени от 5 до 40 мм ограниченный одной долей, без инвазии сосудов, без пораженных лимфоузлов, без прорастания капсулы</p> <p>2.Метастазы в печени не более 3-х от 5 до 30мм, без инвазии сосудов, без прорастания капсулы. При метастатическом поражении должен быть контроль над первичным очагом, либо иметься план последующего лечения первичного очага.</p> |
| ЗНО предстательной железы | 1.Рак предстательной железы в стадии T1-2N0M0 (ПСА до 20 нг/мл, Глисон до 7 баллов, без прорастания капсулы и семенных пузырьков, без пораженных лимфоузлов малого таза, без удаленных метастазов). |
| ЗНО костной системы | 1. метастазы от 5 до 30мм не более 3-х (с подтверждением по данным сцинтиграфии, КТ или ПЭТ-КТ), при отсутствии компрессии спинного мозга, стабильности позвоночника по шкале SINS 1-6 баллов; |
| ЗНО позвоночника, спинного мозга | <p>1. глиомы (рецидив после комплексного лечения);</p> <p>2. менингиомы</p> <p>3. невриномы, шванномы</p> <p>4. артериовенозная мальформация (только при симптоматическом течении, остаточная опухоль после хирургического лечения; хирургическая недоступность; противопоказания к хирургии; отказ пациента от хирургии)</p> |